

**DE  
HAEMORRHAGIIS A  
PRAEVALENTE  
SANGUINIS  
CHARACTERE...**

---

Nicola Fedel



# DE HAEMORRHAGIIS

A FRATRELENTE

SANGUINIS CHARACTERE VENOSO ORTIS

*Dissertatio Inauguralis*

QUM

CONSENSU ET AUCTORITATE PERILLASTRI DIRECTORIS  
AC PRÆSIDENTIS FACULTATIS MEDICÆ SPECTABILIS DOMINI  
REGALI SEC. SOC. CLARENTHORUM D. D. PROFESSORUM ET  
DOCTORUM MEDICINÆ LAUREA HENRIQUE IN MEDICINA  
MEMBER AC PRIVILEGIUM HUIUS CONSEQUENTEM IN ANTI-  
QUARIIS AC CELEBRIBUS UNIVERSITATE TIBURINI

ADJUDICE

DOCT. FRANCISCO FLARER

*Therapies et Cliniques Oculaires P. O.*

UNA CUM THESIBUS DEFENDENDIS

*Mense Junii anno 1844.*

POSSIBLE DISQUISITIONES OFFERENT

**FREDER. NICOLAUS**

*Tyrolensis a Witten.*



TIBURIN REGI

EX TYPOGRAPHIS FINE ET SOCI



*Therapies*

1

2

3

PLURIMUM REVERENDO SACERDOTI

DOMINO

FRANCISCO GIOVANNINI

PATRINO BENEVOLENTISSIMO

HUNC TENSEM LABOREM

TANQUEM

ANIMI GRATI SINCERIQUE CULTUS

MONUMENTUM

PIA CUM DEVOTIONE SACRAT

AUCTOR.

11

12

13

14

15

## Patris Celeberrime!

*T*anta sunt merita Tua a tenerissima aetate ad praesens usque tempus in me calculata, ut primam hanc, quam nuncior, occasionem Tibi contestandi asside arripiam. Tua enim sunt, quae cernis, Tuis consiliis germinarunt, Tuis et maturare.

Uti parens sollicitus, quo jam ab incubulis arbutus fui, nulli parcens labori prolis aibi dilectae salutis consulere solet futuras, ita et Tu, Vir veneratione mea dignissimus, me parvulum jam in deliciis habuisti, juveni imperito et incerti lubenter subsidio venire, quo citius securiusque praefectam attingam metam, nunquam haesitasti. Qui possum tantis favoris specimenibus pro meri-

is respondere? Qui parem refert gratiam? Suscipias ergo benivolo, quo me semper amplexus es, animo velis publicam hanc gratiarum actionem, pro cunctis beneficiis, quorum memoria cordi inscripta me comitabitur acherontis usque ad undas. Te venerari, Te omni pietate prosequi voluptas mea, studium meum, ut nil amplius in te sit mihi restet, quam ut illius, quo hucusque gaviscus sum, amorem et ulterius mihi concedas, et quæ in fides clientelæque Tuae semel receptæ, deinceps quoque in gratia patrocinioque Tuo retineat.

DECEMBER 1800.

**L**egi academicæ satisfactorias, nonnullæ de hæmorrhagiis a prævalente sanguinis charactere venoso ortis conscripsi, nec ullas præstolabitur juvenem virile maturitatis ætatem redierentem. Huic hæmorrhagiarum speciei pertractandæ præsentibus venositatis prævalentia definitionem, præcipua ejus causas atque effectus, transitus ad thrombium, ætiologiam, symptomata, prognosin et therapiam hujusmodi produriorum eruentiorum.

#### DEFINITIO.

Venositas prævalens in se consistit, quod sanguis venosus quantitate vel qualitate, vel circulatione tali pacto vitiosus, ut constitutio venosa tota in organismo locum habeat.

Si tanta sanguinis venosæ copia, aut sanguis carbonico et hydrogenio tam abundans ad pulmones feratur, aut ejusdem circuli tali modo peccet, ut ibi in sanguinem arterialem absolutam metamorphosin subire nequeat: quid



## 8

mirum, si non solus nimis in venis colligatur sanguinis copia, qui colorens atro-purpureum, seri abundantiam, cœoris penuriam et minorem nimis in separationem et coagulum firmam ostendit, sed et quod sanguis, qui in arterias transit, æque minus oxydatus qualitates sanguinis venosi præferat, atque inde venositatem in systemate arteriale amittit?

Eodem modo venositas advenia systema vasorum capillarium adeo occupare videtur, ut indolens venosam et venarum functionem actionemque adquirat; ideoque venositas per totum organismum diffunditur, cujus status constitutio venosa seu vita venosa causata dici potest.

## CAUSÆ PRINCIPALES.

Si alimentorum opportuna nec digestio ac assimilatio prima bene viget, sanguinis autem venosi in arterialem perfecta metamorphosis exhibetur ob vitæ genus duci, ob aërem nimis bene constitutum, præsertim oxygeni æquum vel minime aut contagio repletum, ob nervorum in vas sanguifera efficaciam impeditam aut adfectionibus animi depressivis perturbata, propter menstruum alicuius aut quodamque organorum respiracionis, ac-crecionis, hepatis præcipue, cordis vel arte-

riarum villarum etc., recipit sponte elicit, mor-  
bore, de quo loquimur, esse necessario inse-  
quens.

Haec praeterea momenta, praedispotione ad praevalemiam vasculitatis signata, consensum esse agunt.

Ad eam magis praedisponebant mulieres pro  
sexa virili, temperamentum melancholicum,  
plegmatiscum, habitus laevis atque variat  
tatis periodi, appropinquo ad amissionem  
virescentia etc.

...**SECRET**...

internarum externarumque, et actionis muscularis alterationi, functionis cordis, respiracionis, digestionis, secretionis, nutritionis et actionis systematis vasorum lymphaticorum perturbationi occasionem largitur.

Præterea fertiliam nervosarum affectionum fontem, uti manias, melancholicas, hypochondrias, hysterias etc. nec non genera cachexiarum, v. g. hydropis, scorbuti, febris putridæ, fluxus, typhi, interii, arthritidis amplectitur.

In systemate arterioso vel motus febiles exaristunt, qui cum commotis libere phænomena ea etiam produci, quæ a viciis venositate excitari solent. In systemate autem venoso character sanguinis venosi predominanti æquilibrium viæ inter moventem et resistantem audit, i. e. inter vasa et sanguinem; vi enim vasorum motrix vi resistanti sanguinis haud amplius respondet, quare commotis moribus vasorum timenda veniant, quæ, ut quælibet vi præter modum locitata, in aberrantem actionem transcut, unde conditio pathologica, quam congestionem appellare, originem trahit, modo in peripheria, modo in ramis majoribus aut in centro ipse magis conspicua.

## THEORIA.

Quam conditio pathologica a prevalente venositate orta in utroque systemate sanguifero haec esse habeat, singularis reflexus per systema venosum celsibiles motus systematis arteriali incitato respondere nequaquam potest; hinc necessario contingit, ut sanguis in partibus congestus ex sua natura magis faveatibus, morbo quocunque infestis perturbatusque, indeque ad congestionem magis dispositus, accumulatur, quam ab eam congestionem aut oriatur, aut quae advenit, eo magis incrementum. Quam vero secretio a sanguine ad organum secretens affluentia quantitate ac qualitate ejusque circulo dependet, haec organismi semper functio a norma aberrabit, sanguine quoad qualitatem aut copiam, aut circulationem peccante. Humores igitur conditioni normali respondentes in organum secretorium secreti nequeunt propter antiharmoniam a prevalente venositate ortam inter systema venosum et arterialem nec non inter vasa secreta et sanguinem, si organa singulari statu abnormi laborent; imo si hic status pathologicus ad altiorem gradum erectus rigeat, sanguis ipse loco humorem inquiliorum in orga-

nis secretoribus secreti potest, et hunc in modum hæmorrhagias per secretionem a nimia veracitate nasci possunt.

Veterum fort opinio, hæmorrhagias omnes, nec a mechanica, nec a chronica læsionibus ortas — a recentioribus dynamicis dictas — ex acutissimi vel diapedosî proficisci; attamen nec una, nec altera sententia nobis peritus ardet. Existimamus potius opinionem recentiorum magis probabilem esse, quæ hujusmodi hæmorrhagias originem actioni tribuit, quæ secretioni similis est. Opinatur namq hæmorrhagias dynamicas in relatione cum secretionem existere, quoniam eandem plerumq ex organis secretoribus oriri observaverint.

Quamquam perspicue intelligi nequeat, in qua organorum secretoriorum systematumq sanguiferarum actio et sanguinis ipsius conditio consistat, ut sanguis secretetur, certum tamen est, hæmorrhagias dynamicas vel functione morbose organi, ex quo sanguis fluit, vel systematum sanguiferorum actione perturbata aut in quodam parte facto magis exaltata aut depressa, vel sanguinis condicione mutata, vel causâ hinc vel illâ simul productâ.

Antiqua multi latius hæmorrhagiarum speciei originem a sanguine nimis liquido, quâ in coagulato, morbo acutissimo hæmorrhagico Wertheim, facti potius observatur, pendere arbi-

trahi sunt, epinantes, epinodi sanguinem  
 ostiolo vel parietibus vasorum facilius extrahere,  
 minus adhaerentes, vasa sanguinis  
 copiae et qualitati ordere, dilatari multo san-  
 guine circulante, contracti, ubi minor sangui-  
 nis copia continetur. Tali pacto vas sanguini  
 valde liquido quoque consistere potest, quod  
 majori jure contendere possumus, non rara  
 observatione laesi, sanguinem valde liquidum  
 spongiosumque ex hirudicibus stillem, quin tamen  
 spontaneae haemorrhagiae exemplantur. Prae-  
 terea haec explicatio nimis mechanica nobis  
 videtur. Cum autem haec haemorrhagiarum  
 species plerumque in organismi partibus, in  
 quibus character sanguinis venosi predomi-  
 natur et secretio eminet, e. g. in abdomine  
 et in morbis venositate praesentibus, uti  
 scorbutus, morbo maculoso haemorrhagico Wer-  
 thelli etc., oriri videamus, et praeterea eas  
 observentur, in quibus grassante vita venosa  
 pronasciuntur atque inde sanguinis circulo mutato  
 et secretionis perturbata, etiam haemorrhagiae  
 ex quocunque secretorio organo fieri sunt:  
 quae haemorrhagiarum, de quibus sermo est,  
 originem ab agrossa sanguine nimis fluidi me-  
 chanico per ostiolo parietesque vasorum, quoniam  
 a praesentia sanguinis venositate, et soluti  
 inter systemata sanguifera aequilibrio et per-  
 turbata aut vitiosa secretionis, pendere debet?

Fidel

## ÆTIOLOGIA.

Ut hæc hæmorrhagiarum species melius distinguatur, ad causas prædisponentes et occasionales confugiendum erit.

Ad illas pertinet ætas virilis, ad senectutem vergens, ætus sequior, temperamentum melancholicum aut phlegmaticum, vita inertis, cibi aut huius gastricis alimentis, universali solidarum partium laxitas, testibus animi pathematis aliisque causis depressivis nata, labilis colla, sensibilitas nimis, ad quædam dispositio, morborum debilitantium periodo sepevata, nimis rectis abusus, abortus frequentiores aut partus difficiliores, quæ momenta cuncta organismum ad huiusmodi hæmorrhagias disponant, frequenter præsumpta, si causas occasionales agant, ut aer nimis calidus frigidusque, virus vehementer diutiusque continuatus, nimis ventriculi atque intestinorum repletio, evacuationum sanguinis coarctatum vel naturalium, et menstruorum suppressio, viscerum obstructio, violentior sanguinis agitatio per intensiores motus, cursum nimium, saltationem, equitationem, adfectus animi vehementiores, magnum robor dependium, balnea juxta calidiora, abusum calidiorum, aromaticorum, spirituosorum etc.

## SYMPTOMATOLOGIA.

Antequam sanguis ex quadam organi sui parte erumpat, variis plethorae signis vel in universo corpore vel in parte, cui morbus insidet, manifestari solent: contingunt scilicet a sanguinis copia nervosa cerebrumque prementis torpor, motuum somnolentia inertia, totius corporis lassitudo, somnolentia, ab impetu sanguinis adacto insoliti caloris sensus, titillatio ac dolor.

Ceterum profluvium eructum ex singulis partibus singularem etiam habet prodromum.

Narium haemorrhagiam praecedunt sensus in capite molestus, gravatus, in regione frontali tenebris, siccitas narium, venarum temporum oculorumque insensibilia cum aliquo tempore intollerantia conjuncta, nonnunquam faciei tumor ruborque, aurium tinnitus, vertigo, palmas sponte contrictas, horror, alius adstricta, urina parva, aquosa, artuum frigida.

Hæmoptoeen vero praecedunt metas interdum febriles, prostrum ruber, dyspnoea, thoracis constrictio, praecordiorum anxietas, cordis palpitatio, tussicula, dolor vel sub sternum, vel in pectore interiori ponderosa et punctoria, calor cum horrore alternans, vapor sub-



dolus, pulsus constrictos, duros, irritatos, frequētes.

Vomitum cruentum quoque fœterum denotant precordiorum anxietas, anorexia pondus in ventriculo reams, cordialgus, alimentis autem maxime adacta, nausea, vomendi nixus; epigastrii et hypochondriorum dolor constringens et punctocius, sæpe etiam corundam tumor, sibi perturbatio, horror cum calore alterans, inquietudo, sedes rheumatis frigidique, pulsus rigidi, contracti, crebri, nonnunquam intermittentes, cordis palpitatio, aurium murmur, oculorum obscuratio, vertigo, lipothymia.

Profluvium sanguinis intestinale ex uno antecedent dolor pungens in omni sacri regione firmo, tendo intestini recti, tensiones, dolores colici, serens anxietatis et pressionis ventriculi hypochondriorumque, capitis gravado, anorexia, sibi constipatio, spatium interdu et motus febiles.

Hæmaturiam præsegiunt dolor in regione lumbi et hypogastrica ardens, anxietas, contractio spasmodica testium, abdomen tumidum, dolores colici, alvus constipata, calor et quandoque constrictio urinae urticae atque acutius, dolor perineal, dysuria, stranguria etc.

Metrorrhagiam extra graviditatem et partum indicant dolores in regione lumbari et hypogastrica, acuta plenitudo in ima venter et verum genitalia, abdomen tumidum, tremor et dolor haemorrhoidalium, horror cum calore abterrens, sitis, dolor capitis gravis, vertigo, aurium tinnitus, vomendi visus, dolor spasmodicus in ventriculo, anxietas, respiratio impedita, cardiopalmitus, lassitudo ingens, pulsus frequens, irritatus, non raro intermittens, alvus obstructa.

Sanguis fluens ex oculis atque mammarum papilla dolor in iisdem partibus pectoribus, ardore; stercoribus crustaceis aurium tinnitus; sudoreta vero magnum calor, ardor, pruritus et electus cutis, agitatio molesta, organica, anxietas, debilitas ingens, lipothymia etc. praerogiae solent.

Quamquam haec symptomenata omnibus haemorrhagiis sive a praevalente venositate, sive ab exaltata sanguinis arteriositate ortis communita sint, quaedam tamen momenta diagnostica ad eorum differentias statuendas nobis occurrunt. Sanguis nempe characteris arteriosi praepollentis corpore ejectus floridior sanguine coagulabilis est praesanguine venoso; e contra sanguis exaltata venositate praeditus, atro-purpureus, minus coagulabilis, cruoris agens et

vere abundat. Verumtamen haec signa sunt valde incerta, praecipue in haemorrhagia interna. Licet sanguis characterem arteriosum praepollentem ab initio praeseruat, tamen intra vasa venosae coagulari, atque inde nigrescere et cum aliis humoribus mixtus effundi potest. Praeterea haemorrhagiarum prodromi characteris arteriosi neplurime in graviora, quae characterem venosum habent, esse coarctant. Denique aegri constitutio venosa et cauae venositati prevalenti faventis atque symptomatum defectus, arteriositatem exultantem indicantium, et phaenomenorum praesentia, venositatem nimiam conitantes, de haemorrhagiarum characteribus nullam debent relinquant.

Haemorrhagiam externam ipse sanguinis effusus aut loco aut copiae laesitudo ostendit: internam phaenomena variis pro loci diversitate, in quo accidit, manifestant. Sic sanguinis secreti collectionem in cavo uteri et abdominis sensus tensionis et caloris atque dolor obtusus in his partibus, faciei pallor, extremitatum frigoris, magis debilitas, anxietas, hyposthynia, vertigo, oculorum obambulatio, aurium aurrum, spasmus, convulsiones, pulsum parvi, debiles, intermittentes monstrant. Sanguis vero ex vasis effusus accumulationem in thorace signa suffocationis, sicut in latere perdifficilis, atque

cietas summa, nonnunquam tumor in regione  
lumbi, pulsus contracti, irritati, inaequales  
inducunt. Ejus effusionem in ventriculo cerebri  
aut eandem superficiali symptomata apoplexiae  
propria testatur.

### PROGNOSIS.

In prognosi profunda ratio habenda oportet  
loci affecti, aetatum; effectuum, sanguinis  
effluentis copiae ac qualitatis, et symptomatum  
haemorrhagiam concomitantium. Si effectus  
characteres sanguinis venoso praedominante  
probatos in mentem revocamus, a qualibet haemorrhagia,  
a praesistente venositate orta, morbus hic venosus asserendus esse videtur; nul-  
lum enim dari potest remedium, quod citius  
et totius nimiae sanguinis ventri copiae, me-  
deatur, quam ipsum sanguinem profluvium, cu-  
jus effundium experientia confirmet, quae he-  
morrhoidum fluxus, vomitus cruentus, epistaxis,  
et catamenia insignem ebrietatem in variis affec-  
tionibus, inque praecipue, quae eodem in ve-  
nositate coacta habent, excutere solent.

Ideo critica haemorrhagiae appellantur,  
ex quarum suppressione nec pauci, nec levis  
maie in hominibus, isdem laborantibus, orien-  
tur mala, uti cephalalgia, hemicrania, otalgia,

odontalgia, ophthalmia, erysipelas, vertigo, sopor, apoplexia, angina, diene inflammationes, pleuritis, anthrax, tabes, abdominis tormina, artuum dolor et rigor, convulsiones et epilepsia, febris gravida ete.

Attamen hæmorrhagiae in aliis morbis, quamvis venositatem exaltatam agnoscant, necesse est periculosae evadant, et hæc symptomatice dicuntur, et in febre putrida, putrida, scorbutica, morbo muscularum hæmorrhagico Weillii ete. Verum in huiusmodi affectionibus venositas quoad copiam sanguinis vasa non pervadere videtur, sed potius qualitate vitatur. Praeterea si sanguis nimis venositate gaudeat, si per hæmorrhagiam exotico sanguine infecto tanto magis venositas reproducat, tantum adest, et sanguis effuso sive naturali, sive artificiali veluti precipit, et potius ergo ducimus afferat; nam istae hæmorrhagiae, licet ab initio bene, tunc salutares videantur, statim si ducunt perducunt, nimiam sanguinis copiam corpore expellunt, et inde facti negotio ambiguae sunt et irreparabiles, quia haemodica sanguinis profusio atherosum gravissimum parit mala. Magnus quidem in eo ceratur differentia, quod sanguis subito nec interrupta serie sanguisque copia prorumpit, vel scilicet atque interjectis temporibus intervallis prodant. Sibi-

hominis notum est, tristes semper ac timor-  
dos effectus ex humore hujus nobilissimi, vi-  
salis sanguis jure dicti, jactura nimis oriri, qui  
prae ceteris in systemate nervosi functionum  
alienatione observatur. Sic debilitatem, du-  
cepe post morbum asperitatem asperitatem,  
sensuum obscuritatem vel omnimodam pri-  
vationem, syncope, asphyxiam, aurium tinnitum,  
ophtalmia, amaurosis; vertiginem, capitis  
graviditatem et dolorem, delirium, spasmos,  
convulsionem, torporem vitalem immixtum,  
colorem cutis pallidissimum, faciem collapsam,  
pulsus exiguos, debiles et vacuos, artem frige-  
re, sudores frigidos, nec non mortem ipsam  
inequi conspicimus. Omnia tamen haec phaenomena  
in haemorrhagia, a praevallente arte-  
rialitate ortis, valde graviora et celeriora, et  
post minorem sanguinis perditam copiam, quam  
in illa a venositate praedominante notis ap-  
parent.

E contra profluvia cruenta characteris venosi  
praevallentis acrius perniciet morbos, qui re-  
productionem perturbatam veluti causam agnos-  
cent; hoc spectant cachexiae variae, ut tubercula,  
febris hectica, hydrops, chlorosis etc.

Nimias periculosae haemorrhagiae in locis  
consuetis ortae esse solent illae, quae ex locis  
ineditis et prorsus alienis prorumpunt, sicut

ne hoc quidem maxime semper periculo subponitur, dummodo lesiones sint, uti sanguinis fluxus, quæ metastasi suppetunt interdum ex digitorum apicibus, mammaeum papillæ, oculorum angulis, aurium meatu et in totis cutis superficiei prodilius narrent.

Sic legimus a doctore Alaysio Valente in suo opusculo, cui titulus est : *Voyage médical en Italie, fait en l'année 1820*, descriptum historiam fœminæ 31 annorum, trium filiorum matris, quæ in nosocomio vicentino ob menstrua turbata repetitis suppressa, hæmophiliæ et hæmorrhagiæ ex quocunque metu naturali papillæque mammæarum prorumpentibus laborantem invenit.

Quocunque variis remediis derivantibus, emmenagogis, evacuantibus in auxilium vocata fuerint, sanguis tamen e naribus, auribus, mammae, ventriculo, bronchiis, intestinis recto et urethra pertinaciter fluit. Separatis postea emmenagogis, atque interea adhibitis refrigerantibus, externe autem irritantibus in regione uteri et vaginæ, hanc fœminæ vitas, occurrunt horum supervenientibus, restituta est.

Hæmorrhagiæ magis acutæ, si sanguis e vasis, sed maxime ex organismo elabuntur. Effluvia discrepant pro partium discriminibus, in quibus sanguis secretus accumulatur. Si ef-

fluxio sanguinis fiat in ventriculis cerebri, apoplexia nasci solet, in hancilabus constitutions venosa praeditis frequenter obvia. A sanguine effuso in superficie cerebri oritur symptomata, quae huius organi pressio patere solet. Sanguinis collectio in cavo thoracis, pericardii aut abdominis, pelvis et uteri phaenomena producit, quorum mentionem prius fecimus. Si sanguis secretus colligitur in tertia cellulosa aut in organosae parte, in qua organa nobiliora minime laeduntur, aut in suis functionibus cohibentur; dolorem, prurionis sensus, majorem vel minorem maculas coeruleas, livides gignunt; sed pedestentim hic sanguis iterum absorbetur, aut abscessus formatur, cum quorum pure deinde eliminatur.

In cavitatibus vero sanguinis effusi absorptio necesse locum habet, si ejus copia exigua sit, nec a vasorum laceratione, sed a secretionis origine trahit. Haemorrhagiae tandem mala pariunt in organis ipsis, in quibus contingunt. Secretiones statim post fluxum sanguinis dynamicum reguntur, id quod comprobatur, ejusmodi haemorrhagiae per secretionem respos fieri.

Quam profusa oritur frequenter in organis membranae mucosae vastitia oritur, neque sanguis in membrana nudiperis plurimque se-



tenetur: hæmorrhagias insequatur blennorrhoeae plus minus diuturnae, metrorrhoea, blennorrhoea intestinalis, bronchialis, nasalis, urethrae etc., quae diversas organiceas lésiones, et inflammationes, concretiones, indurationes, ulcera, polypos, scirrhus, cánceros efficere possunt, aliaeque per loci diuturnae phaenomena morbosae varia eoque graviora, quo nobilior, magis gracile atque irritabile visus est, in quo sanguis secretus fuit. Si phaenomena extenderint, vicia hæmorrhagiis valdè periculi, salus in auxilio versatur. Ceterum quumquid mori aliquo tempore post superata vehementiora sanguinis profusiones congrua remedia acceri possit: varia tamen in oeconomia animali symptomata morbosae insurgunt, ut ad spasmos dispositio, fere notquam removenda, ad totius hæmorrhagiae vicine, et alia mala plus minus fatalia, quae supra memoravimus.

#### THERAPIA.

Quaevis cura radicalis tribus incutitur indicationibus praecipuis, quarum prima est causae morbi remota tollere; secunda causam, uti dicunt, proximam, seu morbum ipsum extinguere; tertia tandem vitae et organisationi integritatem restituere.

Quae juxta primam indicationem causas hujusmodi haemorrhagiae et praedispicientes et occasionales, quantum fieri licet, removendas sunt, quibus amotis causa hujus haemorrhagiae speciei proxima, seu haemorrhagia ipsa debetur oportet.

Quam autem in hac haemorrhagiarum specie aequilibrium inter systemata sanguifera a venositate praevalente sublatum atque inde perturbata secretio causam proximam astant, ut sanguis humorum inaequalitatem loco in organis variis, praesertim secretoriis, accernatur: indicatio secunda in eo consistit, ut praevaleat venositas quoad copiam sanguinis aut qualitatem pecuniam, atque sublatum inter systemata sanguifera aequilibrium et perturbata secretio, videlicet secretio sanguinea, ad normalem conditionem redigantur, quapropter medendi methodus, quae hinc indicationibus satibet, eligenda est. Quodsi aequilibrium perturbatum systematum sanguiferorum atque secretionem orientis a nimia sanguinis venosi copia oriatur, methodus evacuantis, sive sanguinem subtrahens, sive purgans juxta causam peculiarem adhibetur. Si dictus status pathologicus non copiae nimiae sanguinis, venositate praesistente praediti, sed ejus qualitati mutetur, ideoque in parte organismi quodam crase sequa majori

irritationi originem suam debent, methodus sedativa sive sopiens, sive leniens optime conducit. Si vero sublatum systematum sanguiferarum æquilibrium et eo effecta secretio cruenta nec a quantitate sanguinis vasculi nimis, nec ab ejusdem qualitate alienata, sed a visorum sanguiferorum in parte quadam predominante laxitate atque ab organi aliquas accormentis juxta majori debilitate, per vasositatem exaltatam procedentem, hæmorrhagias præternaturales hædicta proficiantur, methodus roborans, stimularis locum habet.

Denique tertio indicatio hæmorrhagiarum reliquarum, in progressu recedens, partim medicinalis modendi methodis, partim quoque aliis remediis sive diæteticiis juxta eam inferri, et hanc in modum organismus animalis pristinam sanitatem restitui jubet.

FINIS.

*THESES DEFENDENDÆ.*

1. Pharus occidit gula, quam gladius.
2. Cortex peruvianus nonnunquam artificialem diathesim generat febrilem.
3. Remedium specificum idem amat, ac remedium ignotae actionis.
4. Sectiones pathologicae nunciis a medico eurrente cum fructu institui possunt.
5. Educatio hanc inter optima praevenendorum morborum remedia referenda est.
6. In mulierum morbis tractandis plus prudentiae quam scientiae requiritur.
7. Suspiria in morbis praecedentibus essentialia esse symptoma, et si cum solamine trahantur, vitium cordis dexteri, sive sphaerae ventrae indicare.